

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Quand y penser ?

- Lorsqu'une nouvelle relation s'installe et que vous souhaitez abandonner le préservatif et mettre en place une autre solution de contraception (qui ne protège pas contre les IST)
- Lorsque vous avez eu plusieurs partenaires dans l'année, quelle que soit la protection adoptée
- Lorsque vous désirez concevoir un enfant (certaines infections peuvent être transmises à l'enfant, vous pouvez en parler à votre gynécologue)
- Si vous avez déjà une IST: la présence de l'une peut favoriser la transmission d'une autre...

A qui en parler ?

- Pour des conseils, une orientation :

**Unité de santé sexuelle
et planning familial**
022 372 55 00

 **GROUPE SIDA GENEVE**



**CHECKPOINT
GENEVE**
UN SERVICE DE DIALOGAI
022 906 40 30

- Pour un dépistage ou/et un traitement :

- votre médecin généraliste ou spécialisé (gynécologue, urologue, dermatologue)
- Hôpital Cantonal, policlinique de dermatologie et de vénéréologie
Sur rdv au tél. 022 372 94 23
Horaire des consultations sans rendez-vous :
MERCREDI de 8h00 à 16h00
- Tests anonymes VIH/sida
Informations sur www.vih-sida.hug-ge.ch
Sur rdv : www.testvih.ch ou Tél. 022 372 96 17
- Conseils et test VIH/sida confidentiels pour migrants
Programme santé migrants
89 rue de Lyon
Sur rdv au tél. 022 382 33 33
Avec interprète si nécessaire
- Checkpoint Genève Tél. 022 906 40 30
9 rue du Grand-Pré, sans rendez-vous
Lu & Me de 16h à 20h et Ve de 12h à 16h
En priorité pour hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

PENSEZ A EN PARLER A VOTRE/VOS PARTENAIRES ACTUELS ET ANCIENS - EN CAS D'INFECTION, IL/S DOIVENT EGALEMENT SE FAIRE DEPISTER ET TRAITER

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

| Infections | Transmission possible | Symptômes | Prévention |
|---|--|--|--|
| Bactéries | = | Traitements par antibiotiques/Traitement du partenaire à envisager | |
| Chlamydie Chlamydia trachomatis | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) Contacts bouche-anus (anilingus) | Souvent sans symptômes Sinon : écoulement, démangeaisons, brûlures, douleurs abdominales entre 1 à 12 sem. après l'infection. Complications : infertilité-Grossesse extra-utérine | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : Test d'urine, frottis génital/anal, frottis pharyngé |
| Lymphogranulomatose vénérienne (LGV) Forme de Chlamydia | Pénétrations anales (infection plus rare en Europe) | Souvent sans symptômes Sinon : écoulement entre 10 à 30 jours après l'infection. Complication : infections prostate ou/et rectum | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : Biopsie/frottis anal |
| Blennorragie ou Gonorrhée Gonocoque | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) Contacts bouche-anus (anilingus) | Parfois sans symptômes Sinon : écoulement, démangeaisons, brûlures, dans les 3 à 8 jours après l'infection. Complication : infections diverses, infertilité-Grossesse extra-utérine | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : Prélèvement génital, test d'urine, frottis de gorge. |
| Gardnerella vaginalis | N'est pas transmise sexuellement (flore naturelle de la femme), mais est associée à l'activité sexuelle. | Pertes vaginales | Préservatifs (masculin / féminin) |
| Syphilis Tréponème Palladium | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) Contacts bouche-anus (anilingus) Contacts peau – lésions dues à la Syphilis Contacts sanguins | Trois stades. 1,2,3 Disparition des symptômes entre les stades 1 ^{er} stade : ulcérations (chancre) entre 7 à 90 jours après l'infection. 2 ^{ème} et 3 ^{ème} stades : ganglions, taches rosées. Atteintes neurologique, vasculaire ou osseuse. | Préservatifs (masculin / féminin) Stérilisation du matériel + hygiène + gants (soins, tatouages, piercing) Dépistage : frottis sur l'ulcération, prise de sang |

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

| Infections | Transmission | Symptômes | Prévention |
|--|--|--|---|
| Virus | = | Traitements par antiviraux, pas de guérison possible pour le virus du sida et l'herpes, succès limité pour l'hépatite B et C. (sauf HPV : traitement local par cryothérapie, laser, chirurgie)/Traitement du partenaire à envisager | |
| HPV = Human Papilloma Virus Condylomes (ou crêtes de coq) | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) Contacts bouche-anus (anilingus) Contacts avec verrues ou peau | Verrues sur organes génitaux, anus, muqueuses (parfois invisibles). Peuvent apparaître jusqu'à plus de 6 mois après l'infection. Complications : cancer du col de l'utérus, cancer de la verge (rare) | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : frottis cervical, examen de l'anus Vaccination avec protection à 90% contre verrues, à 70% contre cancer col de l'utérus. |
| Herpes HSP = Herpes Simplex Virus HSV 2 (général) HSV 1 (labial) | Contacts lésions-peau et muqueuses Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) | Vésicules, ulcérations génitales ou sur les lèvres 2 à 21 jours après l'infection, puis récidives. Complications : impact psychologique Chez les enfants : troubles neurologiques + autres atteintes graves | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : test immunofluorescence cutané et prise de sang |
| Hépatite B VHB = Virus Hépatite B | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus) Contacts bouche-anus (anilingus) Voie sanguine: transfusion, partage de seringue | Souvent asymptomatique Fièvre, fatigue, jaunisse, troubles digestifs peuvent apparaître 30 à 180 jours après l'infection. Complications : maladies du foie (cirrhose, cancer), hépatite aigüe conduisant au décès. | Préservatifs (masculin / féminin) Stérilisation, hygiène, gants (tatouages, piercing, injections de drogues) Dépistage : prise de sang Vaccination existante |
| Hépatite C VHC = Virus Hépatite C | Voie sanguine: transfusion, partage de seringue Risque de transmission sexuelle (Pratiques anales ou pendant les règles) | Souvent asymptomatique Fièvre, fatigue, jaunisse peuvent apparaître 15 à 160 jours après l'infection. Complications : maladies du foie (cirrhose, cancer) | Préservatifs (masculin / féminin) Stérilisation, hygiène, gants (tatouages, piercing, injections de drogues) Dépistage : prise de sang |
| Virus du sida VIH=Virus de l'Immunodéficience Humaine | Pénétrations vaginales et anales Contacts bouche-sperme (fellation avec éjaculation) Contacts bouche-anus (anilingus) ou bouche-sexe féminin (cunnilingus) <u>si présence de sang</u> . Voies sanguines: transfusion, partage seringue. | Longue période sans symptômes (7 à 12 ans), symptômes temporaires possibles en primo-infections (1 à 4 semaines après l'infection). Atteinte de l'immunité Complications : maladies opportunistes | Préservatifs (masculin / féminin) Dépistage : test à résultat rapide, prise de sang Traitement après exposition à prendre le plus vite possible (< 48h) si prise de risque avérée |

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Infections

Transmission

Symptômes

Prévention

Champignons = *Traitements antifongique/Traitement du partenaire si récidive*

Mycose, candidose

Candida albicans

Pénétrations vaginales
Contacts bouche-sexe (fellation et cunnilingus)

Peut ne pas être transmise sexuellement

Démangeaisons, rougeurs, écoulement dans les
2 à 48 heures après l'infection.

Hygiène
Dépistage : frottis vaginal

Infection récidivante (fréquente)

Parasites

=

Traitements antiparasitaires (+ literie et vêtements pour Gale et Morpions)/Traitement du partenaire à envisager

Infection à trichomonas

Trichomonas vaginalis

Pénétrations vaginales et anales
Contacts bouche-sexe (fellation uniquement)

Parfois asymptomatique

Écoulement vaginal, démangeaisons dans les 4 à
28 jours après l'infection.

Complications : infections des organes génitaux
ou/et canal urinaire.

Dépistage : frottis
(chez la femme et l'homme)

Infection récidivante fréquente

Gale

Sarcoptes

Contacts étroits, sexuels ou non (contacts avec
objets contaminés comme vêtements, literie,...)

Vésicules cutanées, irritations, démangeaisons
plusieurs semaines après le contact.

Hygiène corporelle et sanitaire
Examen médical de l'entourage proche

Morpions

Ou Phtiriase, poux du pubis

Contacts étroits, sexuels ou non (contacts avec
objets contaminés comme vêtements, literie,...)

Démangeaisons sur le pubis dans les 2 à 3
semaines après le contact.
Parasites visibles !

Hygiène corporelle et sanitaire
Examen médical de l'entourage proche